


MinuteCut™ Esp3 I

酶切位点



产品组成

MinuteCut™ Esp3 I	10 次	25 次
Cat. No.	6035010	6035025
MinuteCut™ Esp3 I	10 μ l	25 μ l
10 \times MinuteCut™ Buffer	50 μ l	1.5 ml
10 \times MinuteCut™ Red Buffer	50 μ l	1.5 ml
10 \times Loading Buffer	1.5 ml	1.5 ml
说明书	1 份	1 份

产品储存

- 20 $^{\circ}$ C 保存,有效期为两年以上。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部： e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

MinuteCut™ 快速内切酶是经过基因工程重组,能够在 5~15 分钟内快速、精确地完成切割的限制性内切酶,适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 的快速酶切。所有 MinuteCut™ 快速内切酶系列产品均可共用一种 10 \times MinuteCut™ Buffer 或 10 \times MinuteCut™ Red Buffer,大大简化酶切反应体系。此外,本公司的去磷酸化、连接试剂在 MinuteCut™ 酶切 Buffer 中具有 100%活性,支持一管化反应,提升“酶切-修饰-连接”的体验。

质量控制

功能活性检测

最适反应温度下,在 50 μ l 反应体系中,1 μ l MinuteCut™ Esp3 I 能够在 5min 内完全消化 1 μ g λ DNA。

超长时间温育检测

最适反应温度下,将 1 μ l MinuteCut™ Esp3 I 与 1 μ g λ DNA 共温育 3h,未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解,延时酶切可能出现星号活性。

使用方法

1. DNA 快速酶切

(1) 按下表配制

	质粒 DNA	*PCR 产物	基因组 DNA
DNA	≤1μg	≤0.2μg	≤1μg
MinuteCut™ Esp3 I	1 μl	1 μl	1 μl
10×MinuteCut™ Buffer 或 10×MinuteCut™ Red Buffer	2 μl	3 μl	3 μl
ddH ₂ O	5~15 μl	5~20 μl	5~20 μl
Total	20 μl	30 μl	30 μl

* 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，且残留的 Taq 酶具有外切酶活性，会直接影响 DNA 酶切的精确度，因此如果酶切产物后续需进行克隆等操作，推荐用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对 PCR 产物进行纯化后再进行酶切。

(2) 轻轻吹打或轻弹管壁混匀，低速离心数秒使液体聚集到离心管管底。

(3) 37℃ 温育 5 min。

(4) 将酶切产物直接电泳（使用 10×MinuteCut™ Red Buffer）或与 10×Loading Buffer 混合后（使用 10×MinuteCut™ Buffer）电泳。

2. 双酶切或多酶切

(1) 每种快速内切酶的用量为 1μl，并根据需要适当扩大反应体系；

(2) 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10，比如常用的双酶切体系至少需要在 20 μl 的反应体系中酶切；

(3) 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

注意事项

1) 不建议进行 10 hr 以上酶切，易导致星活性。

2) 10×MinuteCut™ Red Buffer 可能会干扰酶切产物的荧光分析。因此，酶切产物荧光分析检测时推荐使用无色的 10×MinuteCut™ Buffer。

3) DNA 酶切 5 min 仍不能被切开，说明 DNA 含有抑制内切酶活性的抑制物，可选用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对 DNA 进行纯化后再进行酶切。

4) 如果从野生型的大肠杆菌或者是非限制性内切酶缺陷型（endA+）的宿主菌（比如 BL21、HB101 等）的中提取的质粒 DNA 用作酶切，可能会出现酶切产物拖尾的现象，可选用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对质粒 DNA 进行纯化后再进行酶切。

5) 甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	序列完全重叠 剪切阻断	无影响	序列可能重叠 剪切可能受影响