

RNase A 质检报告单

XJ-QR-016


请检编号	20260433	请检日期	2026.04.29	请检人	黄芳
生产日期	2026.04.29	抽检比例	1/1000	产品序号	8001001
产品批号	20260433	产品名称	RNase A		

填写说明：


内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。

样品 要求 (指标)	空白 1	空白 2	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2
DNA OD ₂₆₀	8.912	7.398	3.454	3.207	3.354	3.570
DNA OD ₂₈₀	4.506	3.748	1.846	1.725	1.810	1.920
DNA OD ₂₃₀	4.703	3.769	1.891	1.932	1.937	2.070
OD ₂₆₀ /OD ₂₃₀	1.90	1.96	1.83	1.66	1.73	1.72
OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀	1.98	1.97	1.87	1.86	1.85	1.86
DNA 浓度 (ng/μl)	445.6138	369.9215	172.6898	160.3430	167.6953	17805079
试剂外观 与组成	√	√	√	√	√	√
电泳检测	√	√	√	√	√	√

备注	1. 本批次共生产 60ml。 2. 质粒 DNA 用 60 μl Buffer E 洗脱。 3. 产品有效期至 2028/04/29。
----	--

检验结果	 合格
------	---

质检员：侯景玉

审核意见	
------	--

RNase A 检验方法

一、目的

通过质粒 DNA 的分离纯化及各项指标的测试，判断送检的产品是否符合质量要求。

二、材料、试剂及仪器

1. 材料：送检的 RNase A、对照其他批次的 RNase A，快速质粒 DNA 提取试剂盒，1.5 ml 离心管若干。
2. 仪器：微量紫外分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、台式离心机。

三、基因组 DNA 纯化操作步骤

按每管 3 ml 的数量收集 6 管新鲜培养的同一菌株，按照快速质粒 DNA 提取试剂盒说明书中的操作步骤，用添加了送检 RNase A 和对照 RNase A 以及不添加 RNase A 的快速质粒 DNA 提取试剂盒同步平行各自抽提 2 管细菌中的质粒 DNA。最终质粒 DNA 用 60 μ l Buffer E 洗脱。

四、纯化的基因组 DNA 的纯度检测步骤

在微量紫外分光光度计上用 Buffer E 调零，取 2 μ l 洗脱的质粒 DNA 检测，记录各个波长的吸光度。

五、电泳检测操作步骤

在 1%琼脂糖凝胶上，按下表依次加入质粒 DNA，电泳 10 分钟，然后在紫外灯下观察并记录分析结果。

电泳加样顺序：

	空白 1	空白 2	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2
质粒 DNA	5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l
6 \times Loading Buffer	1 μ l	1 μ l	1 μ l	1 μ l	1 μ l	1 μ l

七、质量要求与判断方法

1. 试剂外观必须无破损、污渍；试剂组成必须与说明书对应一致；试剂标签内容必须与送检单相符。
2. 送检 RNase A 与对照 RNase A 配套试剂盒纯化得到的 DNA 测得的 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 数值必须在 1.8 \pm 0.1 范围内，且差异必须小于 \pm 10%。
3. 送检 RNase A 和对照 RNase A 配套试剂盒纯化得到的 DNA 电泳检测均无肉眼可见的 RNA 残留。
4. 不添加 RNase A 的试剂盒纯化得到的 DNA 电泳检测有肉眼可见的 RNA 残留。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。